

ค.ศ. ๑๑๑
- กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
รับที่...
ลงวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๐๕ น.



เทศบาลตำบลบึงหลวง
รับที่... ๒๐๙๓
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ที่ อย ๐๐๒๓.๑๔/ว มอก๒๒

ที่ว่าการอำเภอตลาดบัวหลวง
หมู่ที่ ๓ ตำบลตลาดบัวหลวง อย ๑๓๒๓๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองคการบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๒๓.๖/ว ๑๔๘๓๒
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรค
โดยกองระบาดวิทยา ได้รายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาทั่วประเทศ จำนวน ๔๔๔ ราย โดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุด ๔ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ และจังหวัดระยอง

อำเภอตลาดบัวหลวงพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
จึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้


๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคที่สามารถติดต่อ
และแพร่เชื้อได้ โดยเชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ และการถ่ายเลือด
โดยมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดังนี้

๑. หญิงตั้งครรภ์
๒. วัยทำงานอายุ ๒๕-๕๕ ปี
๓. เด็กวัยเรียนอายุ ๕-๑๔ ปี
๔. อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

๑. มีไข้

- (๑) หญิงตั้งครรภ์
- (๒) วัยทำงานอายุ ๒๕-๕๕ ปี
- (๓) เด็กวัยเรียนอายุ ๕-๑๔ ปี
- (๔) อาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- (๑) มีไข้
- (๒) มีผื่นแดงแบบ Maculopapular
- (๓) ปวดศีรษะ
- (๔) เยื่อบุตาอักเสบ
- (๕) ตาแดง
- (๖) ปวดข้อ
- (๗) ต่อม้ำเหลืองโต
- (๘) อูจจาระร่วง

(นางสาวเปรมปวีณ์ พพรพรวัดนากุล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หรือ โรคไข้ซิกา” เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงกึ่ง, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์

อาการ

-  ไข้
-  ปวดศีรษะ
-  ตาแดง
-  มีผื่นแดง
-  ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ

หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 - 7 วัน

 ปกติ

 ผิดปกติ

การติดเชื้อในสตรีมีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...

-  1 พักผ่อนให้เพียงพอ
-  2 ดื่มน้ำมาก ๆ
-  3 หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล
ห้ามกินแอสไพริน

➤ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ <

การป้องกัน

-  1 เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง
-  2 เก็บขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งให้เรียบร้อย
-  3 เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้สนิท หรือเทน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่และอาศัยอยู่ในบ้าน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค